



ENREGISTREMENT

E25. INFORMATION DU PATIENT SUR LA VACCINATION

Vous avez reçu une dose de vaccin, vous trouverez ci-dessous des informations relatives à cette vaccination

INFORMATIONS SUR LA VACCINATION

PRIMO-VACCINATION :

1/ Date de la première injection :

Avec le vaccin:

2/ Date de la seconde injection :

Avec le vaccin:

Si 1^{ère} injection réalisée :

- avec le vaccin Comirnaty® (Pfizer) pédiatrique monovalent : 2^{nde} injection à réaliser 21 à 24 jours après la 1^{ère} dose
- avec le vaccin Spikevax® (Moderna) monovalent : 2^{nde} injection à réaliser 28 à 49 jours après la 1^{ère} dose
- avec le vaccin Comirnaty® (Pfizer) adulte monovalent : 2^{nde} injection à réaliser 21 à 24 jours après la 1^{ère} dose
- avec le vaccin Nuvaxovid® (Novavax) : 2^{nde} injection à réaliser 21 jours après la 1^{ère} dose (tolérance de 21 à 24 jours)

DOSES DE RAPPELS :

Règles générales :

- **Il est recommandé de respecter un délai d'au moins 6 mois depuis la dernière dose de vaccin ou infection et ce, quel que soit l'âge de la personne et le rang de rappel.**
- Pour les rappels, les autorités scientifiques recommandent préférentiellement l'utilisation de vaccins à ARN messenger bivalents.
- Les vaccins bivalents peuvent uniquement être injectés en tant que rappel vaccinal.
- Personnes âgées de moins de 30 ans : il est recommandé de privilégier la vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech bivalent/adapté
- Personnes âgées de plus de 30 ans : le vaccin Moderna monovalent (0,25 mL) et Moderna bivalent/adapté (0,5 mL) peuvent être utilisés pour cette catégorie de population
- Pour les personnes de 18 ans et plus qui en font explicitement la demande, qui présentent une contre-indication aux autres vaccins disponibles, ou qui refusent la vaccination avec un vaccin à ARNm (non recommandé pour les femmes enceintes) : Nuvaxovid® 0,5 mL et Vidprevtyn beta 0,5 mL pour une seule dose de rappel quel que soit le rang.
- En synthèse : informations sur le site du Ministère [Foire aux questions : le rappel vaccinal](#)

3/ Date de la 1^{ère} dose de rappel (troisième injection) : Avec le vaccin:

4/ Date de la 2^{ème} dose de rappel (quatrième injection) : Avec le vaccin:

5/ Date de la dose automnale (2022) (cinquième injection) : Avec le vaccin:

6/ Date de la dose de rappel au printemps 2023 (sixième injection) : Avec le vaccin:

7/ Date de la dose à l'automne 2023 : Avec le vaccin:

INFORMATIONS SUR LES VACCINS

Les documents de référence des vaccins, comme pour tout autre médicament, sont **le RCP et la notice d'information**.

Nous vous invitons à vous y référer pour toute information complémentaire :

- RCP des vaccins [Comirnaty \(Pfizer\)](#)
- RCP des vaccins [Spikevax \(Moderna\)](#)
- RCP du vaccin [Nuvaxovid \(Novavax\)](#)
- RCP du vaccin [Vidprevtyn beta \(Sanofi GSK\)](#)

CONDUITE A TENIR EN CAS D'EFFETS INDESIRABLES

Consultez un médecin **en urgence** si vous présentez l'un des signes et symptômes suivants d'une réaction allergique :

- sensation d'évanouissement ou de tête qui tourne ;
- gonflement des lèvres, du visage ou de la gorge ;
- changements dans vos battements cardiaques ;
- urticaire ou éruption cutanée ;
- essoufflement ;
- nausées ou vomissements ;
- sifflement ;
- douleur à l'estomac

En cas de paralysie faciale, **prenez immédiatement contact** avec un professionnel de santé (médecin ou le 15) pour être pris en charge.

Comme tous les médicaments, les vaccins précités peuvent provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La plupart des effets indésirables surviennent dans les 1 à 2 jours suivant la vaccination.

Ainsi, en cas d'apparition de tout autre symptôme ou en cas de doute, n'hésitez pas à en parler avec votre pharmacien qui saura vous conseiller et vous orienter.





ENREGISTREMENT

E25. INFORMATION DU PATIENT SUR LA VACCINATION

L'enregistrement : principes

Dans un système qualité la traçabilité est une des composantes clés pour garantir une surveillance des pratiques et permettre l'amélioration continue.

L'enregistrement est un document qui permet de conserver des données en lien avec les activités. Les données renseignées peuvent avoir plusieurs fonctions :

- Permettre le suivi dans le temps d'éléments essentiels au bon fonctionnement de l'officine,
- Vérifier la réalisation effective de certaines tâches,
- Permettre le relevé des incidents,
- Conserver un historique des activités,
- Servir de preuves pour répondre à des exigences réglementaires.

Commentaires pour un bon usage

RCP = « Résumé des Caractéristiques du Produit »

Un modèle du recto de ce document est disponible et peut être directement imprimé : « Modèle information du patient sur la vaccination »

- Ce document possède trois usages :
 - Rassurer le patient sur la sécurité du vaccin Moderna
 - Noter la date de rendez vous pour la seconde injection
 - Informer la personne de la conduite à tenir en cas d'apparition de certains effets indésirables
- Au moment de remettre ce document :
 - Discuter de la conduite à tenir en cas de d'apparition d'effets indésirables
- Pour déclarer tout effet indésirable suspecté d'être en lien avec la vaccination, contactez directement le Centre régional de pharmacovigilance <https://ansm.sante.fr/page/liste-des-centres-regionaux-de-pharmacovigilance> dont vous dépendez ou connectez-vous sur le portail de signalement : https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
- **Interchangeabilité des vaccins à ARNm** : la [HAS recommande](#) de réaliser le schéma vaccinal complet avec le même vaccin à ARNm pour la 1^{ère} et la 2nd dose. Cependant, dans le cadre d'une situation de forte tension d'approvisionnement où la complétude du schéma vaccinal ne pourrait être garantie, il est possible de les interchanger afin de finaliser le schéma de vaccination à 2 doses. Le patient doit être préalablement informé, ([MINSANTE N°2021-70](#))
- Concernant la 3^{ème} injection pour les patients sévèrement immunodéprimés : conformément à l'avis du COSV, l'administration d'une dose de rappel peut être réalisée dans un délai inférieur à 6 mois (mais d'au moins 3 mois), dès lors qu'il est jugé par l'équipe médicale que la quatrième dose permettrait d'améliorer la réponse immunitaire. ([DGS-URGENT N°2021-90](#))
- **Simplification du schéma vaccinal** ([DGS-URGENT N°2023 17](#)) : les schémas vaccinaux ont été simplifiés pour les personnes âgées de 5 ans et plus :
 - Quel que soit le passé vaccinal du patient, la posologie consiste désormais en une seule dose de vaccin ;
 - Les notions de primo-vaccination et de rappel ne sont donc plus d'actualité pour ces catégories d'âge.

Références :
[DGS-URGENT](#)