Hypertension artérielle

Pathologie fréquente et insidieuse
Touche 70% des personnes âgées

Pression artérielle élevée dans les vaisseaux sanguins :

→ Supérieure ou égale à la valeur cible (140/90 mmHg quel que soit l'âge)

Avec l'âge la PAD atteint un plateau ou diminue progressivement alors que la PAS continue de s'élever (rigidité artérielle)

Diagnostic

Difficile et contraignant : PA variable

2 mesures successives par consultation; confirmée lors de 3 consultations

→ Évaluation ambulatoire de la PA recommandée

Symptômes

Asymptomatique

Rarement : maux de tête permanents ou culminant le matin au réveil, vertiges, troubles de la vue, saignements de nez

Poussées hypertensives brutales : malaises, violents maux de tête, difficultés à respirer

Automesure tensionnelle :

- Appareil de mesure validé
- Brassard huméral préconisé
- Règle des 3 : 3 mesures matin et soir à 1-2 minutes d'intervalle pendant 3 jours consécutifs
- Au repos, assis, bras reposé

Complications

1) **Principales** : accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde

2) **Autres pathologies vasculaires** : AOMI, IRC, coronaropathie

Paramètre de déclin cognitif → Mesure systématique lors d'un bilan mémoire

Objectifs tensionnels :

< 140/90 mmHg

< 150/80 mmHg après 80 ans ou sujet âgé fragile

Objectif thérapeutique :

Réduction du risque cardio-vasculaire global

Prise en charge de l'HTA isolée

Règles hygiéno-diététiques : 3 mois (adaptation personnalisée)

PAS de restriction sodée stricte → *risque de déshydratation, dénutrition, hypotension orthostatique*

Monothérapie : IEC / Sartan / Ica

Bithérapie à faibles doses : Diurétique thiazidique + IEC / Sartan ou Ica + IEC / Sartan

Si insuffisant après 4 semaines : **changement de(s) la molécule(s), du dosage, ou ajout d'un traitement** → **Trithérapie maximum** ⚠

Bêta bloquant à toute étape si indication spécifique

Focus sur les classes médicamenteuses

Inhibiteur de l'enzyme de conversion / Sartan

En première intention

Effet indésirable contre-indiquant l'IEC : toux persistante survenant dans l'année suivant l'initiation, les angio-oedèmes et l'hyperkaliémie sévère

CI : sténose bilatérale des artères rénales

Cardioprotecteur et néphroprotecteur (à privilégier en cas de diabète)

Action au niveau artériel et veineux

PAS d'association IEC + Sartan

Adaptation à la fonction rénale

✓ IEC

✗ Sartan

Inhibiteur calcique dihydropyridine

En première intention si HTA isolée,

→ À privilégier en cas d'hyperkaliémie franche

EI : oedème, constipation

Adaptation à la fonction rénale

✓ Ica

DFG < 15 mL/min :

CI pour Lercanidipine et Manidipine

✗ **Nicardipine LI**

Non recommandé en continu
risque de chute

✗ **Ica non dihydropyridine**

(Vérapamil / Diltiazem)

En dernière intention,

→ Association aux b-bloquants classiquement déconseillée
(risque de bradycardie)

Diurétiques

Thiazidique : si DFG ≥ 30 mL/min

EI : Hypokaliémie, Hyponatrémie

Épargneur de potassium (Spironolactone) : si DFG ≥ 30 mL/min

uniquement en association en cas d'HTA résistante

EI : Hyperkaliémie, **CI :** IH terminale

Éviter d'associer 2 diurétiques (association diurétique de l'anse + thiazidique seulement en cas d'IR sévère)

✗ **Diurétique de l'Anse (Furosémide)**

Non recommandé

→ Adaptation en fonction de la tolérance

En cas d'IR sévère (DFG < 30 mL/min) ou d'IC congestive

JAMAIS en monothérapie

✗ **Antihypertenseurs centraux / Alpha-bloquants**

Non indiqués (en dernière intention)

Manque de données (morbidité et mortalité)

→ Risque d'hypotension orthostatique (chute)

Béta-bloquant

→ À privilégier en présence d'une indication cardiaque spécifique

(fibrillation atriale, insuffisance cardiaque, coronaropathie)

Si fréquence cardiaque > 50-55 bpm

EI : refroidissement des extrémités, masque les symptômes de l'hypoglycémie (surveillance étroite chez les diabétiques), asthénie, troubles du sommeil, baisse de la libido

- **Prise des médicaments anti-hypertenseurs à tout moment de la journée** (sauf les diurétiques à prendre le matin)
- **Favoriser les associations fixes dans le but de limiter le nombre de comprimés et de prises quotidiennes**
- **Contrôle de la PA atteint dans un délai de 6 mois**

À surveiller :

hypotension orthostatique, chute, malaise, vertige, hypovolémie, natrémie, kaliémie, fonction rénale

Sources :

- Société Française de Cardiologie (SFC) 2023
- European Society of Cardiology (ESC) 2024

Mise à jour en Février 2025