

FICHE RÉFLEXE VACCINATION 2025

RAPPEL

Les indications générales de la vaccination dépendent de l'âge et concernent l'ensemble de la population. Cependant, la vaccination doit être adaptée au profil de chaque patient.

En dehors de l'âge, quatre caractéristiques sont à prendre en compte pour définir les indications particulières :

- Profil de santé (pathologies chroniques, immunodépression, grossesse)
- Activité professionnelle
- «Modes» de vie
- Entourage

RÉFLEXE «ENTOURAGE»

Si la personne vit au contact de personnes immunodéprimées ou fragiles :

- Veiller à être à jour de son carnet vaccinal.

RÉFLEXE «MALADIES CHRONIQUES»

- Être à jour du carnet vaccinal.

Pour toutes les pathologies chroniques :

Pneumocoque : 1 dose / Grippe : 1 dose (campagne automnale)

COVID-19 : 1 dose (campagne automnale)

Indications particulières :

En cas de mucoviscidose, pathologies hépatobiliaires, hémophilie, dialyse, insuffisance rénale, VIH+, candidats à une greffe (organe solide ou CSH) :


- Vaccination contre Hépatite A (VHA) et Hépatite B (VHB)

En cas de déficit en fraction terminale du complément, traitement anti-complément, déficit en properdine, asplénie, greffe CSH :

- Vaccination contre Méningocoque B et Méningocoque ACYW

RÉFLEXE «SENIOR» (65 ans et plus, avec ou sans pathologie chronique)

- Pneumocoque : 1 dose
- Zona : 2 doses (M0-M2)
- dTcaP : 1 dose à 65, 75, 85 ans, etc.
- Grippe : 1 dose tous les ans (campagne automnale)
- COVID-19 : 1 dose chaque année (2 doses à partir de 80 ans)
- Virus Respiratoire Syncytial (VRS) :
 - À partir de 75 ans : 1 dose pendant la campagne automnale (sans rappel)
 - Dès 65 ans pour les personnes avec pathologies respiratoires ou cardiaques



RÉFLEXE «ADO / JEUNES ADULTES»

- dTcaP : 1 dose à 11 ans et à 25 ans
- HPV : 2 doses (M0-M6) de 11 à 26 ans
- Méningocoque ACYW : 1 dose de 11 à 24 ans
- Méningocoque B : 2 doses (M0-M1) de 15 à 24 ans
- ROR : Rattrapage pour ceux qui n'ont pas reçu 2 doses après l'âge de 1 an
- Hépatite B : Rattrapage si non vacciné (après sérologie)
- Varicelle : 2 doses (SO-S6/8) à partir de 12 ans en l'absence d'antécédent (après sérologie)

RÉFLEXE «GROSSESSE»

Avant la grossesse (ou après si non fait) :

- Mise à jour des vaccins du calendrier national, notamment ROR et varicelle (au moins 1 mois avant conception)

Pendant la grossesse :

- dTcaP : 1 dose entre 20 et 36 SA (si pas de vaccination ou moins d'un mois avant l'accouchement)
- Grippe : 1 dose pendant la campagne automnale
- COVID-19 : 1 dose pendant la campagne automnale
- VRS (abrysvo) :
 - 1 dose pendant la période épidémique entre 32 et 36 SA (à 15 jours au moins de la dose dTcaP)
 - sauf en cas d'immunodépression
 - Si naissance dans un délai de moins de 14 jours par rapport à la vaccination ou pas de vaccination, rattrapage par immunisation passive par anticorps monoclonaux

RÉFLEXE POUR LES PROFESSIONNELS

- DTP: obligations employeurs dans nombreux secteurs professionnels
- Coqueluche: santé, petite enfance
- VHB: médico-social
- Grippe: santé, agricoles (élevages aviaires et porcins), personnel naviguant
- VHA: petite enfance, accueil handicapés, traitement eaux usées, restauration collective
- Covid: médico-social
- Rougeole: santé, petite enfance
- Varicelle: santé, petite enfance
- Leptospirose: traitements eaux usées, entretien et travail eaux douces
- Rage: vétérinaires, animaliers, abattoirs, chiroptérologues
- Typhoïde, méningocoques: laboratoires
- Mpox: laboratoire, professionnels lieux consommation sexuelle
- BCG: plus d'obligation depuis 2019

