

*Le N° d'enregistrement est indispensable pour l'externalisation des données patient et médecin (confidentialité)

Numéro d'enregistrement *	NOM	PRENOM
Date :	Code CIP du médicament	N° Facture :
		Age : ans ou mois
		Sexe : <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
1 - PROBLEME (1 choix) :	2 - PRESCRIPTEUR :	5 - ORDONNANCE :
1.1 <input type="checkbox"/> Contre-indication / Non conformité aux référentiels	Nom Prénom :	5.1 <input type="checkbox"/> Classée
1.2 <input type="checkbox"/> Problème de posologie	2.1 <input type="checkbox"/> Médecin généraliste	5.2 <input type="checkbox"/> Transmise au prescripteur
1.3 <input type="checkbox"/> Interaction médicamenteuse	2.2 <input type="checkbox"/> Médecin spécialiste	2.4 <input type="checkbox"/> Sage-femme,
○ A prendre en compte	2.3 <input type="checkbox"/> Médecin hospitalier	2.5 <input type="checkbox"/> Dentiste,
○ Précaution d'emploi	3 - INTERVENTION (1 choix)	2.6 <input type="checkbox"/> Infirmier
○ Association déconseillée	3.1 <input type="checkbox"/> Adaptation posologique	4 - DEVENIR DE L'INTERVENTION
○ Association contre-indiquée	3.2 <input type="checkbox"/> Choix de la voie d'administration	4.1 <input type="checkbox"/> Acceptée par le prescripteur
○ Publiée	3.3 <input type="checkbox"/> Améliorer les méthodes de dispensation /d'administration	4.2 <input type="checkbox"/> Non acceptée par le prescripteur sans motif
1.4 <input type="checkbox"/> Effet indésirable	3.4 <input type="checkbox"/> Survi thérapeutique	4.3 <input type="checkbox"/> Non acceptée par le prescripteur avec motif
1.5 <input type="checkbox"/> Oubli de prescription	3.5 <input type="checkbox"/> Ajout (prescription nouvelle)	4.4 <input type="checkbox"/> Refus de délivrance avec appel prescripteur
1.6 <input type="checkbox"/> Médicament ou dispositif non reçu par le patient	3.6 <input type="checkbox"/> Changement de médicament	4.5 <input type="checkbox"/> Refus de délivrance sans appel prescripteur
○ Indisponibilité	3.7 <input type="checkbox"/> Arrêt ou refus de délivrer	4.6 <input type="checkbox"/> Acceptation du patient (information du patient et prescripteur non contacté)
○ Inobservance		4.7 <input type="checkbox"/> Non acceptation par le patient
○ Incompatibilité physico-chimique		
1.7 <input type="checkbox"/> Prescription d'un médicament non justifié		
1.8 <input type="checkbox"/> Redondance		
1.9 <input type="checkbox"/> Prescription non conforme		
○ Support ou prescripteur		
○ Manque d'information, de clarté		
○ Voie d'administration inappropriée		
1.10 <input type="checkbox"/> Pharmacodépendance		
1.11 <input type="checkbox"/> Monitoring à suivre		

DETAILS POUR ANALYSE DE L'INTERVENTION PHARMACEUTIQUE préciser : DCI, Dosage, posologie, rythme d'administration des médicaments ; Eléments pertinents en relation avec le problème dépisté ; Constantes biologiques perturbées ou concentration d'un médicament dans liquides biologiques (+ normales du laboratoire) ; Décrire précisément l'intervention pharmaceutique.

Contexte de l'intervention

Problème

Intervention

Tableau 1 : description des problèmes liés à la thérapeutique médicamenteuse

PROBLEME LIE A	DESCRIPTION
1.1 Contre-indication ou Non conformité aux référentiels.	- Il existe une contre-indication à l'usage de ce médicament : Par exemple, le patient présente un terrain qui contre-indique le médicament prescrit : asthme et bêta-bloquant. - Non conformité du choix du médicament aux différents consensus ou hors AMM : Un autre médicament est tout aussi efficace et moins coûteux ou moins toxique pour ce patient conformément aux consensus ou recommandations ou référentiels. Médicament prescrit en dehors de son AMM.
1.2 Problème de posologie	- Sous dosage ou surdosage: le médicament est utilisé à une dose trop faible ou trop élevée pour ce patient (dose par période de temps), non concordance avec le DP. - La durée de traitement est anormalement raccourcie : (Ex : antibiotique prescrit sur 5 jours au lieu de 10 jours). - Le rythme d'administration est trop distant ou trop rapproché (Ex : Haldol decamoas® prescrit tous les jours).
1.3 Interaction médicamenteuse	Un médicament du traitement interfère avec un autre médicament et peut induire une réponse pharmacologique exagérée ou insuffisante. - D'après le Gtiam de l'ANSM : Association à prendre en compte (selon la pertinence clinique). Précaution d'emploi. Association déconseillée. Association contre-indiquée. - Interaction publiée mais non validée par le Gtiam de l'ANSM. (préciser les références bibliographiques).
1.4 Effet indésirable	Le patient présente un effet indésirable alors que le médicament est administré à la bonne posologie. Il peut s'agir d'un effet clinique ou biologique, cinétique.
1.5 Oubli de prescription	- Absence de thérapeutique pour une indication médicale valide. - Un médicament n'a pas été renouvelé, (présence dans le dossier pharmaceutique (DP), et le malade ne sait pas ce qui justifie l'absence de reconduction du traitement), un médicament n'a pas été prescrit après un transfert. - Le patient n'a pas bénéficié d'une prescription de prophylaxie ou de prémédication. - Un médicament synergique ou correcteur devrait être associé.
1.6 Traitement non reçu : • Indisponibilité • Inobservance • Incompatibilité physico-chimique	- Non disponibilité de la spécialité: Arrêt de fabrication, suspension d'AMM, rupture de stock, pénurie - Problème d'observance - Incompatibilité physico-chimique entre plusieurs médicaments <i>injectables, aérosol, gouttes buvables...</i> : risque de précipitation entre des médicaments incompatibles en cours d'administration.
1.7 Prescription d'un médicament non justifié	- Un médicament est prescrit sans indication justifiée (ex : le patient nous interpelle) - Ce médicament n'apparaît pas dans le DP ou historique du logiciel (ex : l'équipe et le patient doutent que le médicament prescrit soit à dispenser). - Un médicament est prescrit sur une durée trop longue sans risque de surdosage (Ex : antibiothérapie sur 15 jours pour une pathologie courante).
1.8 Redondance	- Un même principe actif est prescrit plusieurs fois sur l'ordonnance (Ex : Doliprane® et Ipirim®). - Prescriptions de deux médicaments à principe actif différent mais appartenant à la même classe thérapeutique <i>créant une redondance pharmacologique</i> (Ex : Josir® et Xatral®).
1.9 Prescription non conforme : • support ou prescripteur, • manque d'information, de clarté • Voie d'administration inappropriée	Le médicament choisi est correct mais : - le support d'ordonnance n'est pas conforme, le libellé est incomplet (absence de dosage...) ou incorrect, ou mauvaise lisibilité de l'ordonnance - le prescripteur est non habilité (médicament de prescription restreinte) - Plan de prise non optimal (répartition horaire et moment). - La méthode d'administration n'est pas adéquate (reconstitution, dilution, manipulation, durée). - Mauvais choix de galénique (forme solution si difficulté à déglutir ou éviter le cp effervescent sous corticoïde ou forme non compatible avec la Nutrition entérale à domicile)
1.10 Pharmacodépendance	Abus de médicament (laxatif) ou addiction suspectée ou avérée (anxiolytiques) ou usage détourné.
1.11 Monitoring à suivre	Le patient ne bénéficie pas d'un suivi approprié ou suffisant pour son traitement : suivi biologique ou cinétique ou clinique (INR, Hémoglobine glyquée, clairance de la créatinine, ECG, tension artérielle, mesure de concentration d'un médicament...)