


Le calendrier des vaccinations

Les recommandations pour bien vacciner ses patients

Dr Eugénie d'Alessandro

Webinaire CRES PACA, Avril 2026


**MINISTÈRE
DE LA SANTÉ, DES FAMILLES,
DE L'AUTONOMIE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES**
*Liberté
Égalité
Fraternité*



Savoir prescrire en pratique



Les recommandations vaccinales en France

Les recommandations générales

- Concernent toute la population.
- Dépendent uniquement de l'âge.

Les recommandations particulières

Visent à adapter la vaccination au profil de chacun

2026 Calendrier simplifié des vaccinations

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Santé publique France

Âge approprié	Vaccinations obligatoires pour les nourrissons										6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	65 ans et +	
	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois							
BCG	■															
DTP et Coqueluche		■	■	■			■	■			■	■		Tous les 20 ans	Tous les 10 ans	
Hib		■	■	■			■	■								
Hépatite B		■		■			■	■								
Pneumocoque		■		■			■	■								
ROR								■	■							
Méningocoques ACWY							■	■			■	■				
Méningocoque B			■		■		■	■								
Rotavirus		■	■	■												
HPV											■	■				
Grippe																Tous les ans
Covid-19																Tous les ans
Zona																
VRS*																75 ans et +

*Les nourrissons doivent être immunisés contre le VRS soit par vaccination de la femme enceinte, soit après leur naissance.

Dépendent de 4 caractéristiques :

Etat de santé

“Modes” de vie

Entourage

Professions

La consultation vaccinale: 4 étapes systématiques

1. Etablir le profil santé:

- **Âge**
- **Etat de santé:** pathologies chroniques, immunodépression, grossesse, etc.
- Présence de personnes fragiles dans l'**entourage**
- **Modes de vie** au sens large: loisirs, sexualité, toxicomanie, migrants, etc.
- **Professions** relevant de recommandations particulières avec ou sans obligations



Vaccins recommandés
pour ce patient

2. Vérifier le statut vaccinal

- Lorsque l'historique vaccinal est disponible, identifier les vaccins à jour, les schémas vaccinaux incomplets ou non faits.



Vaccins non à jour
compte tenu de son
historique vaccinal

3. Rechercher la présence de contre-indications

- Antécédent de **réaction allergique grave** aux vaccins proposés
- **immunodépression** ou **grossesse** pour les vaccins vivants



Vaccins à faire

4. Obtenir le consentement

- Donner les informations sur la balance bénéfice-risque pour un choix éclairé du patient sur ses vaccinations.

Les situations reflexes

Quels sont les vaccins
recommandés en fonction des
profils patients?

Réflexe sénior

- Pour les personnes de 65 ans et plus, avec ou sans maladies chroniques
 - **Pneumocoque** 1 dose (Prevenar 20® ou Capvaxive®)
 - **Zona** 2 doses M0M2 (Shingrix®)
 - **dTcaP** 1 dose à 65, 75, 85, etc.
 - **Grippe** 1 dose tous les ans pendant la campagne automnale (préférentiellement Efuelda® ou Fluad®)
 - **COVID 19** 1 dose tous les ans pendant la campagne automnale (2 doses à partir de 80 ans)
- **Virus respiratoire syncytial:**
 - À 75 ans, 1 dose pendant la campagne automnale (Abrysvo®, Arexvy®, mResvia®)
 - Dès 65 ans pour les personnes avec des pathologies chroniques respiratoires ou cardiaque

	Personnes de 65 ans et plus				
	65 ans	75 ans	80 ans	85 ans	95 ans et +
DTP-Coqueluche	1 dose	1 dose		1 dose	1 dose
Pneumocoque	1 dose				
Grippe	1 dose par an				
Covid-19	1 dose par an		2 doses par an		
Zona	2 doses (à 2 mois d'intervalle)				
VRS	1 dose pour certaines maladies chroniques	1 dose			

Réflexe adolescents et jeunes adultes

1. Dosage pédiatrique DTcaP (Tetravac Acellulaire) si pas de rappel à 6 ans ou rappel avec dosage adulte.
2. Pour tous les adolescents filles et garçons quelques soient les antécédents de santé sexuelle.
3. Une dose entre 11 et 24 ans quelques soient les antécédents vaccinaux donc y compris chez les enfants ayant déjà fait les vaccins monovalent C, quadrivalent ACYW ou B (dans les deux derniers cas, la dose sera faite au moins 5 ans après la dose précédente).
4. Toutes les personnes nées depuis 1980 doivent avoir reçu deux doses de vaccins ROR après l'âge de un an.
5. En rattrapage pour les adolescents non vaccinés.
6. Pour les adolescents sans antécédent connu de varicelle maladie.

Adolescents et jeunes adultes						
	11 ans	12 ans	15 ans	24 ans	25 ans	26 ans
dTcaP ¹	1 dose (BoostrixTetra [®] ou Repevax [®])				1 dose (BoostrixTetra [®] ou Repevax [®])	
HPV ²	2 doses M0M6 (Gardasil 9 [®])		3 doses M0M2M6 (Gardasil 9 [®])			
Men ACYW ³	1 dose (Nimenrix [®] , Menquadfi [®] ou Menveo [®])					
Men B ³			2 doses M0M1 (Bexsero [®]) ou M0M6 (Trumenba [®])			
ROR ⁴	2 doses après l'âge de 1 an (MMRVaxPro [®] ou Priorix [®])					
VHB ⁵	2 doses M0M6 (Engerix B20 [®]) ou 3 doses M0M1M6 (Engerix B10 [®] ou HBVaxPro 5 [®])					
Varicelle ⁶		2 doses si sérologie négative SOS6 (Varilrix [®] ou Varivax [®])				

Âge approprié	Vaccinations obligatoires pour les nourrissons									
	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans
BCG										
DTP et Coqueluche										
Hib										
Hépatite B										
Pneumocoque										
ROR										
Méningocoques ACWY										
Méningocoque B										
Rotavirus										

Réflexe nourrissons et jeunes enfants

- 5 vaccins obligatoires
 - Hexavalent (Hexyon[®], Infanrix Hexa[®] ou Vaxelis[®])
 - Pneumocoque (Prevenar 13[®] ou Vaxneuvance[®])
 - ROR (MMRVaxPro[®] ou Priorix[®])
 - Men ACYW (Nimenrix[®] ou Menquadfi[®])
 - Men B (Bexsero[®])
- 2 recommandations:
 - Rotavirus (Rotateq[®] ou Rotarix[®])
 - Ac monoclonaux contre le VRS (en l'absence de vaccination de la mère pendant la grossesse)
- + Rappel DTCaP à 6 ans

Réflexe grossesse

- Avant (ou après) la grossesse, mise à jour des vaccins du calendrier national. Notamment **ROR et varicelle** (Grossesse à éviter dans le mois suivant les vaccins vivants).
- VRS: nouvelles recommandations à venir? Dès 28 SA?

Vaccination : êtes-vous à jour?

2025 calendrier simplifié des vaccinations Femmes enceintes

Mois de grossesse	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e	8 ^e	9 ^e	Après l'accouchement
Semaines d'aménorrhée (semaines d'absence de règles)	2 à 6 semaines	7 à 11 semaines	12 à 15 semaines	16 à 19 semaines	20 à 24 semaines	25 à 28 semaines	29 à 32 semaines	33 à 36 semaines	37 à 41 semaines	
Coqueluche (dTcaP*)					1 dose Vaccination quel que soit le moment de l'année				Si la mère n'a pas été vaccinée pendant la grossesse : vaccination de la mère et de l'entourage de l'enfant	
VRS** (Bronchiolite)							1 dose entre 32 et 36 semaines (entre septembre et janvier)		Autre possibilité : injection d'un anticorps monoclonal au bébé à sa naissance	
Grippe	1 dose Vaccination pendant l'automne/hiver									
Covid-19	1 dose Vaccination pendant l'automne/hiver									

*Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite - **Virus respiratoire syncytial



Réflexe maladies chroniques

Personnes avec des pathologies chroniques

Pneumocoque	Toutes les pathologies chroniques	De 2 à 17 ans (Vaxneuvance® ou Prevenar 20®) Pour les 18 ans et plus (Prevenar 20® ou Capvaxive®)
Grippe	Toutes les pathologies chroniques	Dès l'âge de 6 mois 1 dose par an
COVID 19	Toutes les pathologies chroniques	Dès l'âge de 6 mois 1 dose par an
Zona	Pathologies avec surrisque zona et/ou cardiovasculaire	Dès 50 ans 2 doses M0M2 (Shingrix®)
VHB	Pathologies hépatobiliaires, hémophiles, dialysés, insuffisance rénale, candidats à une greffe (organe solide ou CSH), VIH+, VHC+	Dès la naissance (Engerix B10®, HBVaxPro 5®, Engerix B20®, HBVaxPro 10®)
VHA	Mucoviscidose et pathologies hépatobiliaires	Dès l'âge de 1 an avec 2 doses à M0M12 (Avaxim 80®, Havrix 720®, Avaxim 160®, Havrix 1440®, Vaqta 50®)
Men B et Men ACYW	Déficit en fraction terminale du complément, traitement anti-complément, déficit en properdine, asplénie, greffe CSH	Rappel tous les 5 ans (Bexsero®, Trumenba®, Nimenrix®, Menquadfi® ou Menveo®)
VRS	Insuffisance cardiaque et BPCO	Dès 65 ans 1 dose (Abrysvo®, Arexvy®)

Réflexe immunodéprimés

Situation d'immunodépressions

- Déficits immunitaires primitifs
- VIH+
- Asplénie anatomique ou fonctionnelle
- Traitements immunosuppresseurs (dont corticothérapie)
- Chimiothérapies anticancéreuses et radiothérapie
- Greffes organes solides et greffes CSH

Personnes immunodéprimées ¹		
	2 à 17 ans ²	18 ans et plus
dTcaP	Rappels à 6 et 11 ans	Rappels à 25 ans puis tous les 10 ans
Grippe	1 dose par an	1 dose par an
COVID 19	2 doses par an	2 doses par an
Pneumocoque	1 dose (Vaxneuvance [®] ou Prevenar 20 [®])	1 dose (Prevenar 20 [®] ou Capvaxive [®])
Zona		2 doses MOM2 (Shingrix [®])
Vaccins vivants ³	Contre-indiqués	

1. Ne sont abordés ici que les principes généraux de la vaccination des immunodéprimés. La mise à jour des vaccinations doit se faire le plus tôt possible au cours de la maladie, si possible avant la mise en route d'une thérapie immunosuppressive. Importance de la vaccination de l'entourage. Pour plus d'information: « Vaccination des personnes immunodéprimées ou aspléniques, HCSP, 2014 ».
2. La vaccination des nourrissons immunodéprimés n'est pas traitée ici.
3. Vaccins vivants contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées: BCG, Rotavirus, ROR, Varicelle, Fièvre jaune, Dengue, Chikungunya (Ixchiq[®]), Typhoïde (Vivotif[®])

Réflexe Entourage

Personnes vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée ou fragile

Calendrier vaccinal

Être à jour des vaccins en fonction de son âge, notamment ROR

Varicelle

2 doses SOS6 si sérologie négative

Grippe

1 dose par an

COVID 19

1 dose par an

Coqueluche

Stratégie cocooning dans l'entourage des nourrissons:
1 dose de dTcaP pour toutes les personnes dont le dernier rappel date de plus de 5 ans

VHB

Pour l'entourage d'une personne porteuse chronique du VHB avec un schéma accéléré J0J7J21 – M12

Men B et Men ACYW

Pour l'entourage d'une personne à risque élevé d'IIM

Focus sur les nouvelles recommandations 2025-2026



Recommandations vaccinales contre les méningocoques

La vaccination contre les méningocoques

	Obligation				Recommandation	
	Avant 12 mois	De 12 à 23 mois révolus (en rattrapage)	Jusqu'au 5 ^e anniversaire (en rattrapage)	De 5 à 10 ans révolus	De 11 à 14 ans révolus	De 15 à 24 ans (en rattrapage)
ACWY	1 dose 6 mois : <i>Nimenrix</i> [®] Rappel 12 mois : <i>Nimenrix</i> [®] ou <i>Menquadfi</i> [®]	1 seule dose ¹ : <i>Nimenrix</i> [®] ou <i>Menquadfi</i> [®]	1 seule dose ¹ : <i>Nimenrix</i> [®] ou <i>Menquadfi</i> [®] ou <i>Menveo</i> [®] (procédure de remboursement en cours)	Possible selon AMM mais non remboursé	1 seule dose ² : <i>Nimenrix</i> [®] ou <i>Menquadfi</i> [®] ou <i>Menveo</i> [®]	1 seule dose : <i>Nimenrix</i> [®] ou <i>Menquadfi</i> [®] ou <i>Menveo</i> [®]
B	1 dose 3 mois : <i>Bexsero</i> [®] 1 dose 5 mois : <i>Bexsero</i> [®] Rappel 12 mois : <i>Bexsero</i> [®]	2 doses espacées de 2 mois* : <i>Bexsero</i> [®] Rappel 12 mois* après la 2 ^e dose : <i>Bexsero</i> [®]	2 doses espacées d'1 mois* : <i>Bexsero</i> [®]	Possible selon AMM mais non remboursé	Possible selon AMM mais non remboursé	2 doses espacées d'1 mois* : <i>Bexsero</i> [®] ou 2 doses espacées de 6 mois* : <i>Trumemba</i> [®] ou 2 doses espacées d'1 mois* et rappel 4 mois* après la 2 ^e dose : <i>Trumemba</i> [®]

1 - Pour les enfants déjà vaccinés contre les méningocoques C et pour ceux non vaccinés auparavant.

2 - Pour les adolescents et jeunes adultes déjà vaccinés contre le méningocoque C, contre les méningocoques ACWY et pour ceux non vaccinés auparavant.

*Les intervalles mentionnés entre les doses sont des intervalles minimums, il n'y a pas d'intervalle maximum.



La vaccination contre le zona

- Indications:
 - Prévention du zona et des complications: névralgies post-zostérienne, complications cardio-vasculaires, perte d'autonomie
- Recommandations :
 - Pour tous les adultes de 65 ans et plus
 - Dès 18 ans pour les personnes immunodéprimées
 - + dès 50 ans pour les personnes à risque (hors recommandations)
- Schémas:
 - Pour tous: 2 doses à 2 mois d'intervalle
 - Suite à un zona ou une vaccination avec le vaccin vivant (Zostavax®) : même schéma après un délai d'un an
 - Avant initiation d'une thérapie immunosuppressive: 2 doses à un mois d'intervalle et sans délai après un épisode de zona

La vaccination contre les pneumocoques

Recommandations en vigueur

Enfants 0 – 2 ans

Obligatoire

3 doses VPC 13 ou 15
(Prevenar 13[®] ou Vaxneuvance[®])

Adultes 18 ans et plus avec pathologies chroniques

Recommandé

1 dose de VPC 20 ou 21
(Prevenar 20[®] ou de Capvaxive[®])

Adultes 65 ans et plus

Recommandé

1 dose de VPC 20 ou 21
(Prevenar 20[®] ou de Capvaxive[®])

Recommandations à venir?

Enfants 2 à 17 ans avec pathologies chroniques

Recommandé

1 dose de VPP 23
Ou 1 dose de VPC 15 ou 20
(Vaxneuvance[®] ou Prevenar 20[®])

Pour le futur

Pas de rappels mais nouvelles vaccinations à prévoir pour suivre l'évolution des sérogroupes circulants

Autres nouveautés

- Grippe:
 - Utilisation préférentielle du vaccin **haute dose** (Efuelda®) ou du vaccin **adjuvanté** (Fluad®) chez les adultes de 65 ans et plus
- Coqueluche:
 - **Stratégie cocooning** pour toutes les personnes avec un vaccin de plus de 5 ans dans l'entourage d'un nourrisson
 - Pour les **professionnels de santé** avec un vaccin coqueluche de plus de 5 ans dans le cadre d'une urgence sanitaire
- HPV:
 - Vaccination de **tous les adolescents et jeunes adultes, filles et garçons, entre 11 et 26 ans** quel que soient les antécédents de santé sexuelle
 - Schéma à 2 doses M0M6 de 11 à 26 ans recommandé par l'OMS et dans plusieurs pays européens
 - Maintenir 3 doses pour les personnes immunodéprimées

Autres nouveautés

- Rougeole:
 - Toutes les personnes nées depuis 1980 doivent avoir reçu **2 doses après l'âge de un an**
 - Faire une **troisième dose** aux personnes qui ont reçu une première dose avant l'âge de un an
 - En l'absence d'historique vaccinal, il faut faire les deux doses **sans vérification sérologique!**
- VRS:
 - Grossesse: en attente d'une nouvelle recommandation. En fin de grossesse, le vaccin confère une protection inférieure à l'immunisation passive par Ac monoclonaux.
 - Adultes de 65 ans et plus: pas de remboursement à ce jour. Pas d'immunité sur le long terme: vaccination saisonnière?
- Dengue:
 - La vaccination contre la dengue (Qdenga®) est recommandée aux Antilles, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion
 - Chez les enfants de 6 à 16 ans avec antécédent documenté de dengue
 - Chez les adultes de 17 à 60 ans avec comorbidité et avec ou sans antécédent de dengue (hémoglobinopathies, thrombocytopathies, maladies cardio-vasculaires, pulmonaires, rénales, diabète, obésité)

Les obligations vaccinales en France

1. Antidiphtérique	Primo vaccination 2+1 chez tous les enfants
2. Antitétanique	Primo vaccination 2+1 chez tous les enfants
3. Antipoliomyélitique	Primo vaccination 2+1 chez tous les enfants
4. Coqueluche	Primo vaccination 2+1 chez tous les enfants
5. Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b	Avant 5 ans
6. Hépatite B	Primo vaccination 2+1 chez tous les enfants
7. Infections invasives à pneumocoque	Avant 2 ans
8. Méningocoques	Obligation <24 mois, recommandation transitoire 2-5 ans
9. Rougeole	2 doses
10. Oreillons	2 doses
11. Rubéole	2 doses

Ces vaccinations sont pratiquées de préférence « dans les dix-huit premiers mois de l'enfant », selon les âges précis fixés par le calendrier des vaccinations.

Art. L. 3111-2 – II, CSP

« Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants »

Ces obligations s'appliquent à tous les enfants nés depuis le 1^{er} janvier 2018. Sauf pour les méningocoques qui concernent les enfants nés depuis le 1^{er} janvier 2023.

Les rappels DTCaP de 6 et 11 ans ne sont plus obligatoires depuis 2018. C'est la primo-vaccination (2 doses + rappel) qui est obligatoire.

Merci pour votre attention

Et place aux questions!
