

La campagne de vaccination et d'immunisation contre les infections à VRS

Recommandations 2026-2027

Dr Catherine SCHMITT




Protéger contre la bronchiolite et des conséquences à court et à long terme avant l'âge de 2 ans

Pour rappel les infections sévères à VRS entraînent :

- **Un risque accru d'hospitalisation**
- **Un risque augmenté d'asthme jusqu'à l'adolescence**
- **Une augmentation du risque d'otites moyennes aiguës et de la récurrence**
- **Un risque accru d'infections Invasives à Pneumocoques , en particulier chez les nourrissons et les enfants à risque**

Comment prévenir du VRS des nouveaux nés et des nourrissons

→ Par les Mesures Gestes barrières



Comment prévenir du VRS des nouveaux nés et des nourrissons

→ Par les Mesures Pharmacologiques

**La Parturiente
a le choix
entre :**

**Anticorps aux
nouveaux nés ou
nourrissons < 1 an ***

Palivizumab = Synagis
ou
Nirsevimab = Beyfortus
ou
Clesrovimab = Enflonsia

**vaccination
de la mère ****


RSVpreF = Abrysvo

par transfert actif des
Anticorps d'origine
maternelle vers le fœtus
entre la 32^{ème} et 36^{ème}
semaine d'aménorrhées

*Sauf si la mère a été vaccinée pendant la grossesse (vaccination valide s'il y a un délai de 14 jours entre la vaccination et la naissance et si naissance >37 semaine d'aménorrhées)

**Sauf chez les femmes immunodéprimées ou les femmes déjà vaccinées lors d'une précédente grossesse (préférence thérapeutique sans contre-indication formelle)

Modalités de mise en œuvre de la campagne de prévention contre les bronchiolites à VRS* 2026-2027¹:



*VRS : Virus Respiratoire Syncytial
1. DGS urgent du 10/08/2026

En pratique la prise en charge par l'assurance maladie

01

L'Abrysvo et le Beyfortus (nirsévimab) sont remboursés à 65 % depuis le 31/08/2026.

02

Particularité d'Abrysvo bien que son taux réglementaire soit fixé à 65 %, le vaccin reste pris en charge à 100 % au titre de l'assurance maternité.

Prescrire et administrer Abrysvo à la femme enceinte,

Le pharmacien peut vacciner dans le respect du calendrier vaccinal, il doit vérifier le terme de la grossesse, rappeler les modalités de prise en charge et éviter la confusion entre vaccin et anticorps monoclonal.



Le bon produit pour le bon patient

Ne confondez pas Anticorps monoclonaux et vaccin

- Anticorps monoclonal pour nourrisson / nouveau-né / enfant $\leq$ 24 mois
- Vaccin pour : femme enceinte / adulte

Ne cumulez pas les deux sauf exception

Avant toute injection, vérifier :

- le patient
- le médicament
- la dose
- la voie d'administration

Ne pas administrer dans le muscle fessier



Première saison d'exposition au VRS

Beyfortus (nirsévimab)

- Moins de 5 kg : 1 seule injection de 50 mg
1 seule injection de 0,5 mL
- 5 kg ou plus : 1 seule injection de 100 mg



Première saison d'exposition au VRS

Enflonsia (clesrovimab)

- 1 seule injection de 105 mg

- En intramusculaire
- Dans la face antérolatérale de la cuisse
- Dès la naissance pour les enfants nés pendant la campagne VRS ou dès le début de la campagne pour les autres

- En intramusculaire
- Dans la face antérolatérale de la cuisse
- Dès la naissance pour les enfants nés pendant la campagne VRS ou dès le début de la campagne pour les autres

Le bon produit pour le bon patient

Ne confondez pas Anticorps monoclonaux et vaccin

- Anticorps monoclonal pour nourrisson / nouveau-né / enfant $\leq$ 24 mois
- Vaccin pour : femme enceinte / adulte

Ne cumulez pas les deux sauf exception

Avant toute injection, vérifier :

- le patient
- le médicament
- la dose
- la voie d'administration

Ne pas administrer dans le muscle fessier



Enfant $\leq$ 24 mois

Vulnérable à une infection sévère
Deuxième saison d'exposition au VRS

Beyfortus (nirsévimab)

- **2 injections de 100 mg le même jour, chacune sur un site différent**

- En intramusculaire
- Dans la face antérolatérale de la cuisse
- Au cours de la campagne VRS lors de la 2^{ème} saison

Ne pas administrer dans le muscle fessier

Le bon produit pour le bon patient

Ne confondez pas Anticorps monoclonaux et vaccin

- Anticorps monoclonal pour nourrisson / nouveau-né / enfant $\leq$ 24 mois
- Vaccin pour : femme enceinte / adulte

Ne cumulez pas les deux sauf exception

Avant toute injection, vérifier :

- le patient
- le médicament
- la dose
- la voie d'administration

**Chez les femmes enceintes immunodéprimées ou déjà vaccinées contre le VRS lors d'une grossesse précédente
=> privilégier l'immunisation du bébé avec un anticorps monoclonal**



> 75ans ou

$\geq$ 65 ans avec pathologie respiratoire chronique ou cardiaque susceptible de décompenser

Vaccin

Abrysvo ou Arexvy ou mResvia

- 1 seule injection de 0,5 ml



Femme enceinte
Pour la protection passive du nourrisson

Vaccin

Abrysvo

- 1 seule injection de 0,5ml

- En intramusculaire
- Dans le deltoïde
- Vaccination saisonnière. La nécessité d'une revaccination avec une dose supplémentaire n'a pas été établie

- En intramusculaire
- Dans le deltoïde
- Entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, pendant la campagne d'immunisation VRS
- Si la naissance survient moins de 14 jours après vaccination ou si prématurité = rattrapage par anticorps monoclonal recommandé chez le nouveau-né

Notre enjeu

Expliquer clairement les deux voies de prévention, proposées selon la situation et le choix des parents :

- vaccination de la mère avant la naissance ou
- immunisation passive du nourrisson.

Pour aller plus loin...

<https://www.infovac.fr/bulletins-infovac/la-campagne-dimmunisation-contre-le-vrs-des-nourrissons-debutant-infovac-vous-presente-les-questions-reponses-les-plus-frequentes-sur-ce-theme/>

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2026-10_campagne_vrs_2026.pdf

https://www.cres-paca.org/instance/crespaca/extras/calendrier_vaccinal/index.html

<https://www.santepubliquefrance.fr/index.php/vaccination/avis/date-de-debut-de-la-prochaine-campagne-dimmunisation-des-nouveaux-contre-la-bronchiolite-a-vrs>

[https://www.vaccinexpert-officine.fr/mpl/pb.mpl?
x=fa36d1f5b9c9d7632c67653ea83a444a34286bda77057b4b9509087f08c2869fd453693e70c94870ee056818cc289eb806a0f0
468607c63e036763f59c0479490b950db0bb979de4c3e82b4a55ef590a27e4f5b0c40b1d9a45bac0027e01d89fb7b8421764969
206be4e325d6ce6a39c1bb3dde1b322389c&nlt=1](https://www.vaccinexpert-officine.fr/mpl/pb.mpl?x=fa36d1f5b9c9d7632c67653ea83a444a34286bda77057b4b9509087f08c2869fd453693e70c94870ee056818cc289eb806a0f0468607c63e036763f59c0479490b950db0bb979de4c3e82b4a55ef590a27e4f5b0c40b1d9a45bac0027e01d89fb7b8421764969206be4e325d6ce6a39c1bb3dde1b322389c&nlt=1)